

Doses Subconjuntivais, Intracamerais e Tópicas dos Principais Antimicóticos

| Antimicóticos | Dose Subconjuntival | Câmara Vítea | Uso Tópico |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Anfotericina B | 0,8 - 1 mg | 5 mcg | 0,1 - 0,5 - 1 % |
| Cetoconazol | | | 1 - 5 % |
| Clotrimazol | | | 1 % |
| Nitrato de Econazol | | | 1 % |
| Flucitosina | | | 1 % |
| Fluconazol | | | 0,2 - 0,3 % |
| Itraconazol | | | 1 % |
| Nitrato de Miconazol | 5 - 10 mg | 10 mcg | 1 % |
| Nistatina | | | 50.000 - 100.000 UI/g |
| Pimaricina (Natamicina) | | | 1 - 5 % |
| Propionato de Sódio | | | 5 % |
| Tiabendazol | | | 4 - 10 % |

Doses Subconjuntivais, Intracamerais e Tópicas dos Principais Antiinfeciosos

| Antibióticos | Dose Subconjuntival | Câmara Vítea | Uso Tópico |
|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| Amicacina | 25 mg | 400 mcg | 1 - 5 % |
| Ampicilina | 50 - 150 mg | 500 - 5.000 mcg | 1 - 5 % |
| Bacitracina | 5.000 U | | 1.000 - 10.000 U/ml/g |
| Cefalotina | 50 - 100 mg | | 2 - 5 % |
| Cefamandol | 50 - 100 mg | | 5 % |
| Cefazolina | 50 - 100 mg | 2.250 mcg | 2 - 5 % |
| Ceftazidima | 100 mg | 2.000 mcg | 5 % |
| Ceftriaxona | | | 5 % |
| Ciprofloxacina | | 100 mcg | 0,3 - 0,6 % |
| Clindamicina | 15 - 50 mg | 1.000 mcg | 1 - 5 % |
| Cloranfenicol | 100 mg | 1.000 mcg | 0,5 - 1 % |
| Colistimetato | 15 - 25 mg | 100 mcg | 1 % |
| Eritromicina | 100 mg | 500 mcg | 1 - 5 % |
| Gentamicina | 10 - 20 mg | 100 - 200 mcg | 0,3 - 0,8 - 1,2 - 1,5 % |
| Imipenem/Cilastatina | | | 0,5 % |
| Kanamicina | 30 mg | 500 mcg | 3 - 5 % |
| Lomefloxacina | | | 0,3 % |
| Meticilina | 50 - 100 mg | 1 - 2 mg | 5 % |
| Moxalactam | 50 mg | 1.250 mcg | 10 % |
| Neomicina | 125 - 250 mg | | 0,5 - 1 % |
| Norfloxacina | | | 0,3 - 0,6 % |
| Ofloxacina | | | 0,3 - 0,6 % |
| Penicilina G | 0,5 - 1 milhão U | 300 U | 100.000 - 300.000 U/ml/g |
| Piperacilina | 100 mg | | 1,25 % |
| Polimixina B | 100.000 U | | 5.000 - 10.000 -15.000 U/ml/g |
| Rifamicina | | | 1 % |
| Tetraciclina | | | 0,5 - 1 % |
| Ticarcilin | 100 mg | | 0,6 - 2 % |
| Tobramicina | 10 - 20 mg | 100 - 200 mcg | 0,3 - 0,8 - 1,2 - 1,5 % |
| Vancomicina | 25 mg | 1.000 mcg | 2 - 2,5 % |